木村有香*：ユカワザサの新変種について

Arika KIMURA*: De nova varietate *Sasae Arikai* Miyabe & Tatewaki

昭和38年6月，天皇陛下が那須山麓の御用邸に近い小深堀の原野でミヤコザサ節に属する珍らしいササを御発見になり，その後完全に成育した夏のものも同地で再び御採集なされた。それらの資料について鈴木貞雄博士の御協力を得て精研した結果，北海道釧路国川湯に近い湯川沿岸から報告されたユカワザサに極めて近いが，節間と葉鞘に全く毛がない点でそれと異り，その変種とすべきものとの結論に達したので，次の学名を与えることにした。

Sasa Arikai Miyabe et Tatewaki in Trans. Sapporo Nat. Hist. Soc. **13**: 110 (1934); Honda, Nom. Pl. Jap. 397 (1939); Tatewaki in Hokkaido Ringyô-kaihô **38**: 5 (1940).

var. **nasuensis** Kimura et S. Suzuki, var. nov.

A typo internodiis foliorumque vaginis ab initio glaberrimis differt.

Culmi ascendentes circiter 40–65 cm alti, 3–5 mm in diametro, virides, simplices vel e basi semel vel bis ramosi. Internodia glaberrima. Nodi incrassati globosi. Vaginae culmorum pilis minutis retrorsis denique deciduis puberulae. Vaginae foliorum glaberrimae. Folia in apice culmi 4–8, infima ovato-oblonga vel oblonga minora 9–17 cm longa, 3.5–4 cm lata, basi rotundata apice breviter attenuata, mediana oblongo-lanceolata 20–24 cm longa, 4.5–5.5 cm lata, basi subrotundata vel late cuneata, apice subsubito acuminata, superiora lineari-oblonga, omnia membranacea vel chartacea, supra glabra vel interdum pilis longis plerumque adpressis et parce vel parcissime conspersa, subtus glaucina glabra vel raro prope marginem solum pilis longis laxissime pilosa. Setae orales radiatae scabrae.

Nom. Jap.: Nasuno-yukawazasa, nom. nov.

Hab. in Japonia. Prov. Simotuke: in planitie graminoso-herbosa Kohuka-hori, Nasu, altitudine circa 506 m s. m., (Hirohito, Augustissimus Imperator Japoniae, 3 Sept. 1963-holotypus in herb. Tôhoku Univ. Sendaiensis; 21 Jun. 1963; 15 Aug. 1963.—A. Kimura, 9 Aug. 1963; 3 Sept. 1963).

Specimina ampla supra descripta mecum communicavit summa liberalitate et benevolentia Excellentissimus Imperator Augustissimus; viro huic optimo et idem biologo doctissimo floraeque Nasuensis peritissimo summam laudem tribuere et gratias quam maximas agere sanctum mihi est officium.

* 仙台市[redacted], Sendai.